Нуклеотидные банки данных

Ваня Русинов

Экскурс в историю секвенирования

История секвенирования

- ▶ 1951 — Первая последовательность:
бычий инсулин, цепь В (белок!)

Frederick Sanger

История секвенирования

- ▶ 1951 – Первая последовательность: бычий инсулин, цепь В (белок!)
- ▶ 1976 – Первый полный геном: бактериофаг MS2 (РНК)

Walter Fiers

История секвенирования

- ▶ 1951 – Первая последовательность: бычий инсулин, цепь В (белок!)
- ▶ 1976 – Первый полный геном: бактериофаг MS2 (РНК)
- ▶ 1995 – Первый геном бактерии: *Haemophilus influenza*

Craig Venter

История секвенирования

- ▶ 1951 – Первая последовательность: бычий инсулин, цепь В (белок!)
- ▶ 1976 – Первый полный геном: бактериофаг MS2 (РНК)
- ▶ 1995 – Первый геном бактерии: *Haemophilus influenza*
- ▶ 2001 – Первый геном человека: международный консорциум vs. Celera Genomics

Craig Venter

Next Generation Sequencing

Стоимость секвенирования

Стоимость секвенирования

Sanger vs. NGS

Human Genome Sequencing

Термины NGS

- Прочтение (рид)** последовательность, полученная из секвенатора
- Качество прочтения** величина $Q = -10 \log_{10} p$, где p – вероятность ошибочного прочтения нуклеотида; Q вычисляется для каждого нуклеотида рида
- Контиг** секвенированный без пропусков фрагмент ДНК, собирается в компьютере из прочтений
- Скэффолд** набор контигов, про которые известно взаимное расположение и примерное расстояние; разрывы заполняют соответствующим количеством букв N

Сборка NGS

Показатели качества сборки

(Среднее) покрытие среднее число ридов, в которые попал каждый нуклеотид

N50 длина самого длинного контига, такого, что этот и все более длинные контиги покрывают более половины генома

L50 номер контига (при упорядочивании по убыванию длины), длина которого равна N50

Технологии NGS

Table 1 | Main characteristics of current NGS technologies

Technology	Run type			Maximum read length	Quality scores	Error rates
	Single end	Paired end	Mate pair			
Illumina	Yes	Yes	Yes	300 bp	>30	0.0034–1%
SOLiD	Yes	Yes	Yes	75 bp	>30	0.01–1%
IonTorrent	Yes	Yes	No	400 bp	~20	1.78%
454	Yes	Yes	No	~700bp (up to 1 kb)	>20	1.07–1.7%
Nanopore	Yes	No	No	5.4–10kb	NA	10–40%
PacBio	Yes	No	No	~15 kb (up to 40kb)	<10	5–10%

Escalona, Rocha, Posada. *Nat Rev Genet.* 2016; 17(8): 459–469. PMID: 27320129; PMCID: PMC5224698.

Масштабы бедствия

По данным NCBI Genome, на данный момент секвенированы (или в процессе секвенирования) геномы:

- ▶ 214 370 прокариот
- ▶ 33 456 вирусов
- ▶ 18 921 плазмид
- ▶ 14 952 органелл
- ▶ 9 363 эукариот

NCBI Genome содержит далеко не все секвенированные геномы.

Массовые геномные проекты

...

- 2012 100000 геномов людей
- 2012 1000 геномов грибов
- 2011 5000 геномов насекомых
- 2010 10000 геномов позвоночных
- 2009 1000 геномов растений
- 2008 3000 геномов риса
- 2008 1000 геномов людей
- 2008 1001 геном Арабидопсиса

...

Что секвенируют?

- ▶ Геномы
- ▶ Экзомы
- ▶ Транскриптомы
- ▶ Метиломы
- ▶ Метагеномы
- ▶ Сайты связывания ДНК белком (ChIP-seq)
- ▶ Сближенные участки хромосом (HiC)
- ▶ И многое другое

Нуклеотидные банки данных

Соглашения о хранении последовательностей

- ▶ Последовательность однобуквенных обозначений нуклеотидов,
- ▶ записанную от 5'-конца к 3'-концу
- ▶ только для одной цепи ДНК.
- ▶ В случае РНК урацилы тоже обозначают буквой Т.
- ▶ Нуклеотиды нумеруют, начиная с 1 (а не 0).

Нуклеотидные коды IUPAC

Код	Значение	Мнемоническое правило
A	A	A dentine
C	C	C ytosine
G	G	G uanine
T	T	T hymine
K	G или T	K eto
M	A или C	aM ino
R	A или G	puR ine
Y	C или T	pY rimidine
S	C или G	S trong interaction
W	A или T	W eak interaction
B	не A	после A по алфавиту
D	не C	после C по алфавиту
H	не G	после G по алфавиту
V	не T	после T и U по алфавиту
N	любой	aN y

Nomenclature for incompletely specified bases in nucleic acid sequences. Recommendations 1984. PNAS. 1986;83:4-8. PMID: 2417239; PMCID: PMC322779.

INSDC (www.insdc.org)

International Nucleotide Sequence Database Collaboration:

- ▶ Объединяет 3 крупнейших нуклеотидных архива: GenBank, ENA, DDBJ
- ▶ Ежедневный обмен данными
- ▶ Единый формат таблицы локальных особенностей
- ▶ Рекомендации по использованию терминов и ключевых слов в аннотациях
- ▶ И некоторые прочие унификации (например, таблицы генетического кода)

Структура данных в INSDC

Data type	DDBJ	EMBL-EBI	NCBI
Next generation reads	Sequence Read Archive	European Nucleotide Archive (ENA)	Sequence Read Archive
Capillary reads	Trace Archive		Trace Archive
Annotated sequences	DDBJ		GenBank
Samples	BioSample		BioSample
Studies	BioProject		BioProject

ENA data domains

Assembly информация о сборке скэффолдов и хромосом из ридов и контигов

Sequence собранные и аннотированные последовательности

Coding (виртуальный домен) участки, кодирующие белок

Non-coding (виртуальный домен) участки, кодирующие РНК

Marker (виртуальный домен) всякие маркерные участки

Analysis производные данные о сборке или аннотации

Read прочтения NGS

Trace данные капиллярного секвенирования

Taxon таксономическая информация

Sample информация об образце – источнике биологического материала

Study или Project, информация о проекте

ENA data classes

- EST Expressed Sequence Tags
- WGS геномные контиги
- GSS Genome Survey Sequence
- HTC High Throughput Transcriptomic data
- HTG High Throughput Genomic data
- STD собранные и аннотированные последовательности
- CON скэффолды
- STS Sequence Tagged Site
- PAT последовательности из патентов
- TSA транскриптомные контиги
- CDS участки, кодирующие белок

ENA: распределение записей по классам

Assembled/annotated sequences by dataclass

14-Oct-2019

ENA: рост числа записей

ENA: увеличение объема SRA

Формат записи в ENA

```
ID LR694071; SV 1; linear; genomic DNA; STD; VRT; 335 BP.
XX
AC LR694071;
XX
PR Project:PRJEB20083;
XX
DT 01-AUG-2019 (Rel. 141, Created)
DT 12-SEP-2019 (Rel. 142, Last updated, Version 2)
XX
DE Carcharodon carcharias isolate C_car_delaware_2007 genome assembly,
DE chromosome: 1
XX
KW .
XX
OS Carcharodon carcharias (great white shark)
OC Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Chondrichthyes;
OC Elasmobranchii; Galeomorphii; Galeoidea; Lamniformes; Alopiidae;
OC Carcharodon.
XX
RN [1]
RA Canner M., Saneer T.;
RT ;
RL Submitted (31-JUL-2019) to the INSDC.
RL Saneer-Weeksbooth Bashhouse
XX
DR MD5; a7e1a34e45308b36003800689dc43934.
DR BioSample; SAMN04526268.
XX
FH Key Location/Qualifiers
FH
FT source 1..335
FT /organism="Carcharodon carcharias"
FT /chromosome="1"
FT /isolate="C_car_delaware_2007"
FT /mol_type="genomic DNA"
FT /db_xref="taxon:13397"
XX
SQ Sequence 335 BP; 323 A; 12 C; 0 G; 0 T; 0 other; 60
caaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa
...
caaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaac 335
//
```

Формат записи в GenBank

```
LOCUS      LR694071                335 bp    DNA     linear   VRT 12-SEP-2019
DEFINITION Carcharodon carcharias isolate C_car_delaware_2007 genome assembly,
            chromosome: 1.
ACCESSION  LR694071
VERSION   LR694071.1
DBLINK    BioProject: PRJEB20083
            BioSample: SAMN04526268

KEYWORDS   .
SOURCE     Carcharodon carcharias (great white shark)
ORGANISM   Carcharodon carcharias
            Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Chondrichthyes;
            Elasmobranchii; Galeomorphii; Galeoidea; Lamniformes; Alopiidae;
            Carcharodon.

REFERENCE  1
AUTHORS   Canner,M. and Saneer,T.
TITLE     Direct Submission
JOURNAL   Submitted (31-JUL-2019) Saneer-Weeksbooth Bashhouse
FEATURES   Location/Qualifiers
            source                1..335
                                     /organism="Carcharodon carcharias"
                                     /mol_type="genomic DNA"
                                     /isolate="C_car_delaware_2007"
                                     /db_xref="taxon:13397"
                                     /chromosome="1"

ORIGIN
1 caaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa
...
301 caaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaac

//
```

Базы метаданных NCBI

- Taxonomy** Таксономическая база данных
- BioProject** Содержит информацию о проектах секвенирования
- BioSample** Содержит информацию об образце, из которого получена НК
- Assembly** Информация о сборке, ссылки на последовательности контигов, скэффолдов, и репликонов
- Genome** Информация о геномах организмов на основании имеющихся геномных сборок

RefSeq

- ▶ Автоматическая (по большей части) база данных
- ▶ Свой формат AC (содержат _)
- ▶ Значительно меньше вырожденность, чем в GenBank (меньше повторяющихся последовательностей)
- ▶ Аннотации валидируются и обновляются
- ▶ Аннотации более унифицированные, чем в GenBank
- ▶ Некоторые записи даже курируются
- ▶ Формат записей практически идентичен GenBank

Nucleotide

Для упрощения поиска нуклеотидных последовательностей через web-интерфейс и Entrez (nucscore).

- ▶ Содежит нуклеотидные записи из: INSDC (GenBank/ENA/DDBJ), RefSeq, PDB, TPA (Third Party Annotation)
- ▶ Одна и та же последовательность может встречаться много раз (например, идентичные записи INSDC и RefSeq)
- ▶ Содержит все нуклеотидные последовательности в NCBI (после слияния с GSS и EST в июле 2019).

Nucleotide collection (nr/nt)

- ▶ Содержит только последовательности и их идентификаторы в INSDC, RefSeq, PDB.
- ▶ Идентичные последовательности кластеризуются.
- ▶ Служит для поиска с помощью BLAST.

Поиск по аннотациям и загрузка данных

- NCBI
1. Глобальный поиск по базам NCBI (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search>)
 2. E-Utilities – Web API к системе Entrez (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501/?term=e-utilities>)
 3. Batch Entrez – по файлу со списком идентификаторов (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/batchentrez>)
 4. FTP (<ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/>)
- ENA
1. Search & Browse (<https://www.ebi.ac.uk/ena/browse>)
 2. Advanced search (<https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/advanced-search>)
 3. REST URLs (<https://www.ebi.ac.uk/ena/browse/data-retrieval-rest>)
- DDBJ
1. Search & Analysis (<https://www.ddbj.nig.ac.jp/services-e.html>)
 2. ARSA (<http://ddbj.nig.ac.jp/arsa>)
 3. GetEntry (<http://getentry.ddbj.nig.ac.jp/top-e.html>)
 4. FTP (<ftp://ftp.ddbj.nig.ac.jp/>)